



## Ficha Técnica

# FLORANID® TWIN TURF

Abono complejo NPK (MgO) 20-5-8 (2) con nitrógeno de liberación lenta procedente de IBDU (ISODUR®) y de CDU (CROTODUR®) y con micronutrientes

### Datos técnicos del producto

#### ABONO CE

#### Contenido declarado

- 20 % Nitrógeno total (N)
    - 8,0 % Nitrógeno amoniacal
    - 2,5 % Nitrógeno nítrico
    - 5,7 % Nitrógeno procedente de IBDU
    - 3,8 % Nitrógeno procedente de CDU
  - 5 % Pentóxido de fósforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) soluble en citrato amónico neutro y agua
    - 3,8 % Pentóxido (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) de fósforo soluble en agua
  - 8 % Óxido de potasio (K<sub>2</sub>O) soluble en agua
  - 2,0 % Óxido de magnesio (MgO) total
    - 1,6 % Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
  - 17,5 % Trióxido de azufre (SO<sub>3</sub>) total
    - 14 % Trióxido de azufre soluble en agua
  - 0,020 % Boro (B) total
  - 0,010 % Cobre (Cu) total
  - 0,850 % Hierro (Fe) total
  - 0,100 % Manganeso (Mn) total
  - 0,010 % Zinc (Zn) total
- Pobre en cloruros
- pH:** 6-7 (1:10 en agua)
- Densidad:** 850 kg/m<sup>3</sup>
- Granulometría:** 0,7-2,8 mm

### Características:

Abono complejo a base de nitrógeno de liberación lenta procedente de ISO-DUR® y CROTODUR® magnesio y micronutrientes. Especial para la fertilización de céspedes de manejo intensivo. Su elevado contenido y proporción de nitrógeno en forma de Isodur® (IBDU) y Crotodur® (CDU), permite un suministro de nitrógeno más prolongado y regular, evitándose absorciones excesivas y pérdidas por lavado de este nutriente.

#### Forma de aplicación:

Floranid® Twin Césped 20-5-8 (2) asegura el aprovisionamiento adecuado de los céspedes no sólo de nitrógeno, sino también de fosfato, potasio, magnesio y micronutrientes.

La acción de liberación lenta del nitrógeno a una dosis uniforme permite reducir el número de aplicaciones y garantiza un crecimiento equilibrado y regular, sin fluctuaciones indeseables.

De éste modo no es sólo posible ahorrar costos gracias al número reducido de aplicaciones de fertilizante sino también gracias a la disminución del número de siegas. Floranid® Twin Césped 20-5-8 (2) puede ser aplicado uniformemente tanto a mano como con fertilizadora. Como regla, 2 a 3 fertilizaciones durante el período vegetativo son suficientes.

#### Dosis de aplicación:

Césped de uso intensivo: 30-50 (g/m<sup>2</sup>)

Aplicar cada 2 o 3 meses.

**Envase:** Saco de 25 kg

