



Ficha Técnica

Vitanica® CuTan SL

LEGISLACIÓN NACIONAL

Complejo de Cobre

Datos técnicos del producto

Composición producto

Cobre (Cu) soluble en agua 5% p/p

Cobre (Cu) complejado con ácido Hep-taglucónico 5% p/p

Intervalo de estabilidad de la fracción complejada: pH entre 3-9

Características:

Vitanica® CuTan SL es un producto novedoso que, además del gluconato de cobre añade un 2% de polisacáridos a la formulación, consiguiendo un efecto nutricional que mejora la absorción del cobre gracias a su fórmula complejada y también, un efecto bioestimulante que potencia la respuesta de la planta frente a diferentes presiones externas. **Advertencia y recomendaciones de uso:** Debido a la fitotoxicidad propia del cobre, no se recomienda tratamientos en momentos/zonas frías y de elevada humedad o en variedades/cultivos sensibles al cobre, y en especial durante el periodo vegetativo de los frutales, floración o envero. Como cultivos con mayor sensibilidad a tratamientos de cobre podemos encontrar manzanos de la variedad Golden, Starking, Reineta, Jonathan, etc. Perales de agua, melocotonero, cerezo (en determinadas condiciones climáticas), Curcubitáceas, etc. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina o ácida. Debido a la gran variedad de formulaciones existentes, es recomendado realizar pruebas de mezcla y pruebas en campo previas a la aplicación. Cualquier cuestión, ponerse en contacto con el técnico de la zona.

Cultivo	APLICACIÓN FOLIAR		FERTIRRIGACIÓN	Nº aplicaciones/ciclo	RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
	Dosis (%)	Dosis máxima l/ha	l/ha		
Uva Vinífera	0,15 % - 0,22 %	2	2-4	1-2	Iniciar la aplicación con brotes de 3 a 4 hojas, repitiendo hasta momentos previos a floración
	0,15 % - 0,22 %	2	2-4	1-2	Aplicar desde la pinta hasta la pre-cosecha
Uva de Mesa	0,15 % - 0,22 %	2	2-4	1-2	Iniciar la aplicación con brotes de 3 a 4 hojas, repitiendo hasta momentos previos a floración.
Frutales de hueso y Pepita	0,15 % - 0,22 %	2	2-4	1-3	Aplicaciones en otoño previo y durante la caída de hojas, yema hinchada y en poda de limpieza.
Citricos	0,15 % - 0,22 %	2,5	2-4	1-3	Aplicaciones previas hasta pre-floración y a partir de cuajado hasta el momento previo al envero
Solanáceas	0,15 % - 0,22 %	2	2-4	2-4	Al aire libre e invernadero. Aplicar desde 9 o más hojas del tallo principal desplegadas hasta madurez completa
Curcubitáceas	0,15 % - 0,22 %	2	2-4	2-4	Al aire libre e invernadero. Aplicar desde la quinta hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta madurez completa
Otras Hortícolas	0,15 % - 0,22 %	2	2-4	2-4	Aplicar a partir de la 5ª hoja verdadera y con la aparición de los primeros síntomas y repetir a los 10 - 12 días.
Olivo	0,15 % - 0,22 %	2,5	2-4	1-2	Puede aplicarse durante todos los estadios del cultivo
Extensivos	0,1 % - 0,17 %	2	-	-	Aplicaciones preventivas

Aspecto: Líquido

Color: Marrón oscuro

pH (1:10): 4.0-5.0

Densidad ((20°C) : 1.21-1.27 Kg/L

Envase: 4x5L



www.compo-expert.es

info: compoexpert@compo-expert.com