



## Datos técnicos del producto

### Contenido declarado:

6 % nitrógeno (N) total

5,5 % nitrógeno (N) orgánico

0,5 % nitrógeno (N) amoniacal

32 % aminoácidos totales\*

12 % aminoácidos libres\*

\*Contiene aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis enzimática de proteínas de origen animal.

5% *Ecklonia maxima*

### Aminograma (%):

ASP (3), GLU (7,4), ALA(11,3), ARG(0,2), PHE(1,4), GLY(29,3), HIS(0,3%), HPR (11,7), ILE(0,3), LEU (1,9), LYS (2,1), MET(0,4), PRO (23,2), SER(0,2), TYR(0,7), THR(0,1), TRP(0,1), VAL(0,5).

### Otros datos de interés agronómico:

23 % Carbono orgánico.

45 % Materia orgánica.

30 % Ácidos fúlvicos

Categoría A en clasificación de metales pesados

pH: 6-7 (20°C)

Densidad 1,15 kg/l (20°C)



APTO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA según reglamento CE Nr. 834/2007 y CE Nr. 889/2008

Envase: 10 L

## Ficha Técnica

# Basfoliar® Energy

## Aminoácidos

### Características:

Basfoliar® Energy SL es un producto orgánico altamente eficiente en aplicación foliar, gracias a su contenido en nitrógeno orgánico, aminoácidos, ácidos fúlvicos y contenido en *Ecklonia maxima*. El producto contiene un 32 % de aminoácidos totales, de los cuales, el 12 % corresponde a aminoácidos libres gracias al proceso de hidrólisis enzimática. Basfoliar® Energy SL contiene un 30 % de extracto húmico, de los cuales el 100 % del contenido corresponde a ácidos fúlvicos. El producto está enfocado para **promover el desarrollo vegetativo y otorgar energía al cultivo en cualquier momento de máxima demanda, como etapas de floración, cuajado, engorde, inicio de cultivo, etc.**

Los aminoácidos juegan un papel importante en las plantas como fuente de energía al otorgar almacenamiento y suministro de nitrógeno orgánico. Aplicaciones foliares de Basfoliar® Energy aporta un grado de energía y fuerza extra en momentos de máxima demanda/necesidad del cultivo, reactivando o manteniendo la actividad del cultivo.

| Cultivo    | Época de Aplicación                                                                           | Dosis de aplicación [l/ha] | Dosis de aplicación [%] |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Frutales   | Desarrollo vegetativo y cualquier momento de máxima demanda de energía que demande el cultivo | 1.5-2 l/ha                 | 0.15-0.2 %              |
| Hortícolas | Durante todo el ciclo                                                                         | 1-2 l/ha                   | 0.1-0.2 %               |
| Olivo      | Desarrollo vegetativo, formación de fruto y desarrollo de rendimiento graso                   | 1-2 l/ha                   | 0.1-0.2 %               |
| Cítricos   | Desarrollo vegetativo y cualquier momento de máxima demanda de energía que demande el cultivo | 1.5-2 l/ha                 | 0.15-0.2 %              |
| Extensivos | Durante todo el ciclo                                                                         | 1-2 l/ha                   | 0.1-0.2 %               |

### Almacenamiento, uso e incompatibilidades:

Almacenar en un lugar protegido de la humedad, el calor y la luz.

Conservar a temperatura ambiente (2°C - 45°C).

En su envase original puede ser almacenado durante 12 meses.

No conservar el producto diluido (máximo 12 horas).

No mezclar con aceites minerales y con productos de reacción alcalina o ácida. No mezclar con cobre.

No está permitido el pasto de animales de granja o el uso de los cultivos como hierba de pasto durante un mínimo de 21 días tras su aplicación.

Se prohíbe el acceso a animales de granja hasta 21 días después de la aplicación.

Características microbiológicas:

Salmonella —> Ausencia en 25 g; Escherichia coli —> < 10 NPM/g

### Fabricante:

COMPO EXPERT Spain S.L.

P.I. La Mezquita, C/B-3, parcela 203 12600

La Vall d'Uixo · Spain

[www.compo-expert.es](http://www.compo-expert.es)

info: [compoexpert@compo-expert.com](mailto:compoexpert@compo-expert.com)

